



DR. BOB CASAER

PLASTISCHE

RECONSTRUCTIEVE

ESTHETISCHE HEELKUNDE

MICROCHIRURGIE

WWW.CASAER.BE

WWW.BORSTVERGROTING.BE

AZ Sint-Jan Brugge

Ruddershove 10

8000 Brugge

T 050/452360

plastische.heelkunde@azsintjan.be

Henri Serruys Ziekenhuis AV

Kaïrostraat 84

8400 Oostende

T 059/555231

privé: De Huidkliniek

Leopold II laan 224

8670 Oostduinkerke

T058/628882

Contact

info@casaer.be

ENKEL BIJ DRINGENDE

PROBLEMEN

0478/277905

BUIKWANDCORRECTIE

VOOR DE INGREEP

Op de preoperatieve consultatie kreeg je een voorschriftje met een ontsmettende zeep Hibiscrub voorgeschreven. De 2 dagen voor de ingreep dien je je telkens te wassen met deze zeep, als mogelijk ook de ochtend van de ingreep.

Tijdens een algemene verdoving wordt via een toestelletje dat op je vinger geplaatst wordt het zuurstof gehalte in je bloed gemeten. Indien je gelakte of gel nagels hebt, dien je minstens 1 vinger vrij te maken om goede geleiding voor het toestel mogelijk te maken.

Je hoeft geen elastische buikband op voorhand aan te kopen, deze zijn voorzien in het ziekenhuis.

Je dient je nuchter aan te melden bij opname. Het opname-uur werd je meegedeeld op de preoperatieve consultatie.

Gelieve geen juwelen aan te doen bij opname (inclusief piercings) De schaamstreek mag geschoren worden.

TIJDENS DE INGREEP

De verpleegkundige van de afdeling zal je voorbereiden voor de ingreep.

Alvorens je de operatiezaal binnengebracht wordt, zal Dr. Casaer nog een pre-operatieve markering maken. Als je eventueel nog vragen hebt, kan je die dan nog stellen.

Als je wakker wordt zal er reeds een elastische buikband zijn aangebracht. Ook zijn er pneumatische botjes rond de benen. Deze blazen af en toe op om de bloeddoorstroming in de benen te stimuleren. Dit helpt flebitis te voorkomen. Een blaassonde werd ook tijdens de ingreep geplaatst.

Het bed is in een gevouwen positie gezet om de spanning op je buik te verminderen. In geen geval mag het bed de eerste 24u in horizontale positie worden gebracht.

Pijnstilling wordt op regelmatige basis via het infuus toegediend zodat je comfortabel bent.

De opname duurt in principe 2 tot 3 nachten. De eerst dag na de ingreep zal je eerst op de rand van het bed mogen plaatsnemen. Als dit goed gaat, mag je even opzitten in de zetel. Als dit alles goed gaat zal de blaassonde verwijderd worden. Progressief zal je verder gemobiliseerd worden zodat je ofwel de 2e ofwel de 3e dag na de ingreep het ziekenhuis mag verlaten. Alle redonbuisjes zullen zijn verwijderd bij ontslag.



DR. BOB CASAER

PLASTISCHE

RECONSTRUCTIEVE

ESTHETISCHE HEELKUNDE

MICROCHIRURGIE

WWW.CASAER.BE

WWW.BORSTVERGROTING.BE

AZ Sint-Jan Brugge

Ruddershove 10

8000 Brugge

T 050/452360

plastische.heelkunde@azsintjan.be

Henri Serruys Ziekenhuis AV

Kaïrostraat 84

8400 Oostende

T 059/555231

privé: De Huidkliniek

Leopold II laan 224

8670 Oostduinkerke

T058/628882

Contact

info@casaer.be

ENKEL BIJ DRINGENDE

PROBLEMEN

0478/277905

BUIKWANDCORRECTIE

NA DE INGREEP

Je buikband dien je 3-4 weken dag en nacht te dragen. Vanaf dan mag je die geleidelijk verminderen. Langer dan 6 weken is niet nodig. Buikspier oefeningen mag je voorzichtig terug hernemen vanaf 6 weken na de ingreep.

Op de wonden is huidlijm aangebracht zodat je vlot kan douchen. De wonden blijven zo gedurende enkele weken beschermd. Deze lijm wordt op de controle raadpleging verwijderd. Douchen mag, maar geen bad of zwembad zolang de wonde niet helemaal geheeld is (geen korstjes meer). Na het douchen mag je het naveltje ontsmetten met isobetadine.

Je dient gedurende 10 dagen spuitjes te krijgen tegen trombose in de benen. Hiervoor kreeg je een voorschriftje op de preoperatieve raadpleging.

Doe het rustig aan. Geen zware voorwerpen (of kinderen) tillen gedurende 6 weken.

De buik komt initieel nog gezwollen voor. Dit zal geleidelijk verminderen.

Een eerste controle raadpleging wordt voorzien 1 week na de ingreep.